

Marca Comercial: Maxforce® Prime

Nome Técnico: Imidacloprido

Grupo Químico: Neonicotinóide

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0040.001-7

N.º C.A.S.: 138261-41-3

Formulação: Gel

Concentração de i.a.: p.a. Imidacloprido 2,15% p/p. Inertes: Atrativos, Estabilizantes, Espessantes, Dispersantes, Conservantes, Desnaturante, Antiespumante, Solventes, Umectante 97,85% p/p.

Denominação Química: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-Ylideneamine.

Fórmula Bruta: C₉H₁₀ClN₅O₂

Dados Toxicológicos: Toxicidade aguda: DL50 oral superior a 5000mg/kg (Bayer); DL50 dérmica superior a 5000 mg/kg.

Classe: inseticida

Embalagem/ Apresentação: Display contendo 4 seringas de 30g cada/ Caixa de embarque contendo 12 displays com 4 seringas de 30 g.

Indicações de Uso

O Maxforce® Prime é um inseticida gel com alta atratividade, que mantém a umidade e atratividade por um longo período. Devido à sua formulação moderna, suporta elevadas temperaturas. Sua excelente adesão permite a sua aplicação em lugares estratégicos e em superfícies diversas.

É indicado para controle de baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), para ser utilizado por desinsetizadoras em indústrias de alimentos, residências, hospitais, restaurantes, escolas, trens, metrô, empresas de ônibus, aeroportos, hotéis, etc.

Modo/ Equipamento de aplicação

Maxforce® Prime é indicado em áreas sensíveis onde não é possível a aplicação de inseticidas convencionais, como por exemplo, equipamentos elétricos e eletrônicos etc. Aplicar em fendas, frestas em paredes; atrás e debaixo de eletrodomésticos (geladeiras, fogões, máquinas de lavar, forno de micro-ondas, etc.); embaixo de pias e balcões, dentro e atrás de armários, embaixo de bancos e poltronas de trens, metrô e outros maquinários.



Tempo de reentrada: Em decorrência da natureza não volátil de Imidacloprido e da formulação gel, pode-se considerar que a exposição inalatória não ocorrerá com Maxforce® Prime. Portanto não é estabelecido tempo de reentrada após aplicação do produto.

Precauções: Não deve ser aplicado nas áreas sujeitas a lavagens frequentes ou recentemente tratadas com outros inseticidas.

Não aplicar sobre carpetes, tecidos ou mármore devido ao risco de ocorrerem manchas.

Espécie de baratas	Dose (mg/m ²)
<i>Blattella germanica</i>	0,25
<i>Periplaneta americana</i>	

Antídoto/ Tratamento: Não há antídoto específico. Descontaminação e tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: 0800 02 43 334

Telefone de Emergência Médica: 0800 70 10 450

TeleBayer: 0800 017 99 66

Observação

Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.