

Marca Comercial: Racumin® Pó
Nome Técnico: Cumatetrilil
Grupo Químico: Hidroxicumarinas
Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0013
N.º C.A.S.: 5836-29-3
Formulação: Pó de contato
Concentração de i.a.: p.a. Cumatetrilil 0,7500% p/p Desnaturante 0,0002% p/p Inertes: Corante, tensoativo e excipientes 99,2498% p/p
Denominação Química: 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin
Fórmula Bruta: C ₁₉ H ₁₆ O ₃
Dados Toxicológicos: Toxicidade aguda: DL50 oral, ratazana: aprox. 5000 mg/kg (Bayer); DL50 dé rmica, ratazana: > 5000 mg/kg (Bayer)
Classe: rodenticida
Embalagem/Apresentação: Frasco auto-aplicador de 1 Kg, caixa de embarque com 6 Kg

Indicações de Uso

Racumin® Pó é um raticida em pó hidro-repelente que age por contato ou ingestão. Resistente por mais tempo em condições de alta umidade. É indicado para controle de camundongos, ratos e ratazanas em áreas urbanas e rurais.

Modo/ Equipamento de aplicação

Procure os caminhos freqüentados pelos roedores, evitando alterar a disposição dos objetos na área tratada, pois, se os roedores notarem qualquer alteração no trajeto habitual, poderão alterar as trilhas e caminhos utilizados. Aplique uma camada com cerca de 8 cm de largura sobre as superfícies freqüentadas pelos roedores, como tocas, buracos, trilhas, etc, com auxílio de uma polvilhadeira. Renovar sempre que necessário.

Antídoto/ Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático; em caso de ingestão, fazer lavagem, administrar carvão ativado e purgante salino; transfusão de sangue quando os fenômenos forem muito graves.

Telefone de Emergência: 0800 02 43 334

Observação

Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.