

Nome comercial: OPTIGARD BARATA GEL.

Princípio ativo: Hidrametilnona.

Concentração: 2% m/m.

Formulação: gel.

Classe química: amidinohidrazona.

Registro no Ministério da Saúde: 3.3428.0004.001-6.

Modo de ação: por ingestão.

Compatibilidade: pode ser aplicado com inseticida não repelente, como OPTIGARD LT. Utilizar após a secagem do inseticida.

Apresentação

- ▶ Seringas de 30 g

FOR LIFE UNINTERRUPTED™
E a vida continua™

syngenta.

INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: amidinohidrazona.

Nome comum: Hidrametilnona.

Ação tóxica: inibição da respiração celular.

Antídoto: tratamento sintomático.

TOXICOLOGIA

- ▶ DL50 dérmica em (ratos) > 2.000 (mg/kg).
- ▶ DL50 oral em (ratos) > 2.000 (mg/kg).
- ▶ Irritabilidade dérmica em coelhos: não irritante.
- ▶ Irritabilidade ocular em coelhos: não irritante.

Antes de usar OPTIGARD BARATA GEL, consulte sempre as instruções do rótulo e da ficha técnica.

Central de Atendimento Syngenta C.A.S.A.: 0800 704 4304

PROFESSIONAL PEST MANAGEMENT

ELIMINE AS BARATAS POR COMPLETO.

A melhor escolha para o controle eficaz de infestações.

Optigard® Barata
Gel

syngenta.

TM

OPTIGARD BARATA GEL é um produto à base de hidrametilnona. Não escorre, não mancha e tem altíssima atratividade: as baratas são eliminadas por completo. Com prática formulação em gel, OPTIGARD BARATA GEL é a ferramenta ideal para um controle completo e manutenção do tratamento contra baratas de cozinha ou de esgoto.


BENEFÍCIOS

- ▶ Alta atratividade: elimina os focos da infestação.
- ▶ Praticidade: vem em seringas prontas para uso.
- ▶ Economia: com bico aplicador, oferece maior rendimento com gotas menores.
- ▶ Não escorre e não mancha as superfícies tratadas.
- ▶ Pode ser utilizado com pistola aplicadora.
- ▶ Produto de ação lenta que promove a transferência do ativo para outras baratas.

TESTES DE EFICÁCIA

Testes realizados com baratas *Periplaneta americana* e *Blattella germanica* comprovam a eficácia de OPTIGARD BARATA GEL em ambientes com oferta de alimento, mantendo sua eficácia mesmo 90 dias após a aplicação.

Aplicação de OPTIGARD BARATA GEL na dose de 0,5 gramas.



OPTIGARD BARATA GEL tem eficácia superior a concorrentes, em aplicações de pequenos pontos, após 90 dias.

Dosagem utilizada em teste: 0,25 g.



MELHOR APLICAÇÃO, MELHOR CONTROLE

OPTIGARD BARATA GEL vem pronto para uso: basta pressionar o êmbolo da seringa lentamente, depositando pequenos filetes de gel nos pontos mais acessíveis às baratas (despensas, cozinhas, banheiros, garagens). Aplique também em rachaduras, frestas e parte externa de fogões e geladeiras.

- ▶ Evitar o contato de água com o produto.
- ▶ Não utilizar inseticida aerossol próximo aos locais de aplicação do produto.
- ▶ Não aplicar junto com pulverizações líquidas convencionais.
- ▶ Manter o produto na embalagem original, em local ventilado e iluminado.
- ▶ Pode ser usado em conjunto com inseticida não repelente, como OPTIGARD LT. Utilizar o gel após a secagem do inseticida não repelente.

PRAGAS-ALVO



Barata
(*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*)

DOSAGEM RECOMENDADA

Blattella germanica (barata de cozinha)

0,5 g/m²

Periplaneta americana (barata de esgoto)

0,5 a 1,0 g/m²

Optigard® Barata
Gel

syngenta.